

ABTRAGUNG VON DARMPOLYPEN

Wir haben bei Ihnen am einen oder mehrere Polypen im Dickdarm abgetragen. Damit es nicht unnötigerweise zu einer Nachblutung kommt, sollten Sie die nächsten 4 Wochen folgende blutverdünnende Medikamente meiden:

VERBOTENE MEDIKAMENTE:

Blutverdünner wie Plavix/Clopidogrel, Marcoumar, Aspirin Cardio, Tiatral, Xarelto

Schmerzmittel wie Aspirin, Alcacyl, Treupel, Dolocyl, Voltaren, Ponstan, Brufen, Dismenol, Mephadolor, Tonopan Neue Formel etc.

Grippemittel wie Treupel Grippe, Alka-Seltzer, Aspégic etc.

ERLAUBTE MEDIKAMENTE:

Erlaubt sind folgende Schmerzmittel: Dafalgan, Panadol, Codein, Novalgin, MST, Tramal

Wenig **Blut im Stuhl** darf es während einigen Tagen nach einer Polypenabtragung haben. Sollte aber viel Blut auf einmal oder immer wieder relativ viel Blut aus dem Darm kommen, können Sie uns in die Praxis (041- 412 30 12) oder aufs Natel anrufen. Sollten Sie uns nicht erreichen können, melden Sie sich beim Hausarzt oder beim Notfallarzt. Sollte viel Blut aus dem Darm austreten und sollte es Ihnen zusätzlich schwindlig werden, rufen Sie sofort die Nr. 144 und eine bekannte oder verwandte Person an, und sagen Sie genau, wo Sie sich befinden. Öffnen Sie die Haustüre.

Sie brauchen keine Angst zu haben. Die äusserst selten auftretenden Blutungen können immer gestoppt werden. Es ist wichtig, dass Sie sich rechtzeitig melden.

Bis zur definitiven Wundheilung sollten Sie die nächsten 4 Wochen **keine Flugreisen** und **keine unbegleitete Wanderungen** unternehmen, damit eine unerwartete starke Blutung nicht noch mehr Probleme macht an einem ungünstigen Ort.

Dr. med. A. Gut / Dr. med. R. Bründler

und Praxisteam